



atrialfibrillationassociation

afa-se.eu

## Råd gällande Cordarone (Amiodaron)

Cordarone är ett läkemedel som används vid behandlingen av hjärtarytmier. Det är en mycket effektiv medicinering men den kan ge biverkningar som din läkare kommer att behöva övervaka. Cordarone används för att hjälpa till att hålla hjärtat i sin normala (sinus) rytm. Det används också när hjärtat har en onormal rytm (arytmi) för att hjälpa det att återgå till normal rytm.

### Bieffekter

Även om läkemedlet i allmänhet tolereras väl har Cordarone biverkningar som kan påverka olika delar av vår kropp.

### Hud

När du tar Cordarone kan huden få en gråaktig/blå nyans. Det här kommer att återgå till det normala när man slutar använda Cordarone, men kan ta lång tid.

Medan du tar Cordarone kan du bli mer känslig för solbränna. Använd solskydd och hattar för att förhindra den här bieffekten. Eftersom Cordarone är kvar i kroppen under lång tid kan det vara nödvändigt att fortsätta använda solskyddskräm under ett par månader efter avslutad behandling.

### Sköldkörteln

Sköldkörteln producerar ett hormon som styr kroppens ämnesomsättning. Cordarone kan påverka den här körtel och göra den både överaktiv (detta sker hos cirka 2 % av personerna som tar Cordarone) eller underaktiv (detta sker hos cirka 6 % av personerna som tar det). Din läkare kommer regelbundet att ta blodprover för att kontrollera om något av dessa symptom utvecklats. Om du upplever symptom på extrem trötthet eller rastlöshet bör du kontakta din läkare för att diskutera detta. Läkaren kommer att ordna så att du får ta blodprov om det inte redan har gjorts. Både en överaktiv och låg sköldkörtelfunktion kan lätt behandlas med läkemedel.

Atrial Fibrillation Association

info@afa.org

www.afa-international.org

www.afa-se.eu

### Ögon

Små avlagringar kan bildas i hornhinnan i ögat (den klara yta som täcker pupillen, iris och vita delen av ögat). De häravlagringarna är inte skadliga. Du kan dock se effekten av sådana ögonavlagringar genom att titta in i starkt ljus på natten t.ex. vid bilkörning. Bland personer som tar Cordarone upplever 1 av 10 en blåaktig halo. Det här är inte heller skadligt.

### Lungor

Cordarone kan orsaka problem med förtjockning (fibros) av vissa strukturer i lungorna. Om du känner att du har problem med andfåddhet bör du omedelbart kontakta din läkare.

### Levern

Cordarone påverkar i sällsynta fall leverns funktion, vilket kan förbättras genom att minska dosen av Cordarone. Din läkare kommer att kontrollera om någon påverkan på levern sker genom att göra rutinmässiga blodprover.

### Övervakning

Cordarone är en mycket användbar medicin och din läkare kommer att skriva ut den om han/hon anser att den är den bästa medicinen för dig. Ovan nämnda biverkningar, om än ovanliga, visar att kontrollen är viktigt. Du kommer att behöva ses över av din läkare var sjätte månad när du tar Cordarone och du behöver lämna blodprov för att se till att din sköldkörtel- och leverfunktion är opåverkad och att inga andra problem har utvecklats, inklusive eventuell påverkan på INR-nivå om Warfarin tas.

Författare: Dr Matthew Fay, allmänläkare

Författare: Dr Thomas Fähræus, elektrofysiologi

Med hjälp av: Professor A John Camm, elektrofysiologi

Mrs Jayne Mudd, specialiserad arytmi-sköterska



Affiliated to Arrhythmia Alliance  
www.hearrhythmcharity.org.uk

Kontakta Atrial Fibrillation Association för mer information  
Förvaltare: Professor A John Camm, Professor Richard Schilling,  
Mrs Jayne Mudd, arytmi-sköterska  
©2011 Registered Charity No. 1122442

